

خوراک طیور گوشتی

تولید شده در شرکت خوراک دام پارس

خوراک مرغ گوشتی

رشد سریع مرغ گوشتی نیاز به پروتئین و اسیدهای آمینه را در آن‌ها افزایش می‌دهد. میزان غذای مصرفی روزانه طیور با میزان انرژی خوراک، مواد مغذی آن، سن، وزن بدن، حرارت محیط و میزان تولید آن‌ها رابطه مستقیم دارد. افزایش انرژی غذا موجب کاهش مصرف روزانه آن می‌شود در صورتی که نسبت انرژی به پروتئین در خوراک طیور در نظر گرفته نشود و پرندۀ غذای خود را تنها براساس انرژی تامین نماید، میزان رشد طیور بر اثر کاهش پروتئین مصرفی کاهش پیدا می‌کند. به طور کلی طیور به اندازه‌ای غذا می‌خورند که احتیاجات انرژی خود را تامین کند که در این صورت خوراک دادن به صورت اختیاری یا آزاد امری غیرمنطقی نخواهد بود.

” شرکت خوراک دام پارس، از بزرگترین و بهترین تولیدکنندگان خوراک مرغ گوشتی در ایران به شمار می‌رود.“

جدول عملکرد خوراک در گله های گوشتی

سن هفته	ضریب تبدیل	میانگین وزن زنده (گرم)	مقدار مصرف تجمعی خوراک (گرم)
۱	۰/۹۲	۱۸۰	۱۶۵
۲	۱/۱۳	۴۵۰	۵۱۰
۳	۱/۳۲	۸۸۰	۱۱۷۰
۴	۱/۴۴	۱۳۵۰	۱۸۷۰
۵	۱/۶۲	۱۸۰۰	۲۹۲۰
۶	۱/۷۵	۲۴۵۰	۴۳۰۰

مرغداران گرامی

کارشناسان واحد خدمات پس از فروش این شرکت آماده پاسخگویی به هرگونه سوال و انتقال دانش و راهنمایی های لازم می باشند.





توصیه مصرف

به منظور تنظیم مناسب جیره غذایی به جدول دستور مصرف خوراک مرغ گوشتی مراجعه و یا با متخصصین تغذیه شرکت خوراک دام پارس تماس حاصل فرمایید.

۰۲۱-۶۶۹۲۵۰۱۴-۱۵

مزایای پلت نمودن خوراک

- ۱- بدلیل اینکه خوراک به صورت همگن و یکنواخت می باشد، امکان انتخاب را از پرند سلب نموده و تمامی قسمت های موجود در خوراک بالاجبار توسط پرند استفاده می شود و تمامی گله به یک میزان از مواد مغذی مصرف نموده و از انتخاب ذرات درشت و عدم مصرف ذرات ریز که عمدتاً ویتامین ها، مواد معدنی، اسیدهای آمینه ضروری و سایر افزودنی ها می باشد جلوگیری می کند.
- ۲- در سالنهای مرغداری که از دان آردی استفاده می کنند، غیریکنواختی رشد به چشم می خورد که این امر در تغذیه با خوراک پلت دیده نمی شود.
- ۳- پلت نمودن تحت فشار و دمای بالا (۷۰ تا ۸۵ درجه سانتیگراد) انجام می شود که موجب بهبود کیفیت خوراک به شرح ذیل می شود:
 - الف) بهبود کیفیت مواد که باعث ژلاتینه شدن مواد نشاسته ای شده و قابلیت هضم را بالا می برد.
 - ب) عوامل ضدتغذیه ای و بازدارنده رشد و میکروارگانیسم هایی مثل باکتریهای پاتوژن از قبیل E.coli و سالمونلا فعالیت خود را از دست می دهند.
- ۴- عمل فرآوری دان بصورت پلت میزان ضایعات و پرت را کاهش می دهد.
- ۵- دان پلت زمان مصرف خوراک را کاهش می دهد که این امر به خصوص در مناطق گرمسیری حائز اهمیت می باشد.
- ۶- در شرایطی که تنش و تحرکات عصبی وجود دارد میزان مصرف خوراک کاهش می یابد، لذا مصرف خوراک بصورت پلت حائز اهمیت است.
- ۷- از آنجاییکه مصرف روغن گیاهی حاوی اسیدهای چرب ضروری در مرغداری (بدلیل خطر فساد، مشکلات نگهداری، مخلوط نشدن یکنواخت) به راحتی امکان پذیر نمی باشد، در خوراک پلت به دلیل مخلوط شدن بصورت همگن قابل مصرف می باشد.
- ۸- پلت کردن خوراک، سبب کاهش گرد و غبار شده و از بروز بیماری های تنفسی نظیر CRD جلوگیری می نماید.
- ۹- پلت کردن خوراک به حفظ کیفیت مواد خوراکی کمک نموده و سطح تمامی اجزا تشکیل دهنده با هوا و آلودگی ها را کمتر می نماید، لذا قدرت ماندگاری خوراک پلت از خوراک آردی بیشتر می باشد.
- ۱۰- هزینه های کارگری در خوراک دهی با دان پلت کمتر می باشد.

- ۱- مطابق جدول روبرو خوراک مورد نیاز گله را بر اساس (نژاد، سن و ...) انتخاب نمود و نسبت به خرید و مصرف آن اقدام شود.
- ۲- با توجه به این که شکل و آنالیز خوراک ها متفاوت می باشد، هنگام توزیع در سالن با دان قبلی مخلوط گردد و پس از ۴۸ ساعت دان جدید به تنهایی مورد مصرف قرار گیرد.
- ۳- محل نگهداری خوراک می بایستی فاقد رطوبت و دور از تابش نور مستقیم خورشید بوده و از ورود حشرات، پرندگان و جوندگان جلوگیری گردد.

نوع خوراک	میزان مصرف به ازای هر پرند (گرم)
سوپراستار	۱۶۵
پیشدان	۷۵۰
میاندان	۱۵۰۰
پایان دان ۱	۱۹۰۰
پایان دان ۲	۶۳۸

شکل فیزیکی و زمان مصرف

نام محصول	نوع	زمان مصرف
سوپراستار مرغ گوشتی	پلت ۱/۸ یا کرامبل	۰ تا ۷ روزگی
پیشدان مرغ گوشتی	پلت	۸ تا ۱۹ روزگی
میاندان مرغ گوشتی	پلت	۲۰ تا ۳۱ روزگی
پایان دان ۱ مرغ گوشتی	پلت	۳۲ تا ۴۲ روزگی
پایان دان ۲ مرغ گوشتی	پلت	۴۳ تا زمان کشتار

- ۴- حمل خوراک از کارخانه به واحد مرغداری با وسایط نقلیه ویژه که ضد عفونی شده باشد انجام پذیرد.
- ۵- چیدمان کیسه ها روی پالت در دمای ۱۲-۲۵ درجه سانتیگراد با تهویه مناسب باشد.
- ۶- ترجیحاً مدت زمان نگهداری از سه هفته تجاوز نکند.
- ۷- میزان خوراک مصرفی با توجه به شرایط استاندارد با انحراف ۵ به شرح جدول ذیل می باشد.
- ۸- برای اطمینان ار بهترین شروع، جیره آغازین را با سوپر استار آغاز نمایید.
- ۹- اگر پرند ابتدا دان را به شکل کرامبل و سپس پلت دریافت کند، دستگاه گوارش سازگاری بیشتری نسبت به اندازه ذرات پیدا نموده و لذا رشد بیشتر و راندمان مناسب تری نسبت به پرند ای که ابتدا جیره آردی دریافت کرده را خواهد داشت.
- ۱۰- بسته بندی در کیسه های نایلونی (پلی پروپیلن) ۴۰ کیلویی می باشد.
- ۱۱- خوراک تولیدی درب کارخانه به مشتریان گرمای تحویل می گردد.
- ۱۲- استفاده از دان ۲ منوط به وزن ۲۳۰۰ گرم می باشد.

جدول مشخصات فرمول خوراک مرغ گوشتی

نام محصول	انرژی (کیلوکالری/کیلوگرم)	پروتئین (%)	لیزین قابل هضم (%)	متیونین+سیستئین قابل هضم (%)	تروئین قابل هضم (%)	والین قابل هضم (%)	ایزولوسین قابل هضم (%)	کلسیم (%)	فسفر قابل دسترس (%)
سوپر استارتر گوشتی	۲۹۳۰	۲۲-۲۴	۱/۲۵	۰/۸۸	۰/۷۸	۰/۹۷	۰/۸۹	۱	۰/۵
پیش دان مرغ گوشتی	۲۹۵۰	۲۱-۲۰	۱/۲	۰/۷۹	۰/۸۵	۰/۸۵	۰/۷۷	۱/۰۵	۰/۴۵
میان دان مرغ گوشتی	۲۹۸۰	۱۹-۱۸	۱/۱۵	۰/۷۳	۰/۷۷	۰/۷۷	۰/۶۹	۱	۰/۴
پایان دان ۱ مرغ گوشتی	۳۰۰۰	۱۸-۱۷	۱/۱	۰/۷	۰/۷۲	۰/۷۲	۰/۶۴	۰/۹۵	۰/۳۸
پایان دان ۲ مرغ گوشتی	۳۰۵۰	۱۷-۱۶	۱	۰/۶۳	۰/۶۷	۰/۶۷	۰/۵۹	۰/۹۵	۰/۳۸

ترکیبات خوراک مرغ گوشتی

ذرت، گندم، کنجاله سویا، گلوتن ذرت، کرینات کلسیم، دی کلسیم فسفات، فیتاز، آنزیم، روغن گیاهی، لیزین، متیونین، نمک، مکمل معدنی و ویتامینه تخمگذار، توکسین بایندر و سایر افزودنی ها طبق سفارش

